



Abidor® CAF



paracetamol + cafeína

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Forma farmacêutica: comprimido

Concentração do princípio ativo: 500 mg + 65 mg

Cartucho contendo 2 blisters com 10 comprimidos.

Display contendo 25 blisters com 4 comprimidos.

Display contendo 10 blisters com 10 comprimidos.

USO ORAL

USO ADULTO

Composição:

Cada comprimido de 500 mg contém:

Paracetamol DC90*500 mg (equivalente a 555,56 mg de paracetamol DC 90%)

Cafeína.....65 mg

Excipientes q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: povidona, celulose microcristalina e dióxido de silício.

*povidona, amido, amido pré-gelatinizado, amidoglicolato de sódio, ácido esteárico, etilparabeno, propoilparabeno.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

INDICAÇÕES

Indicado para o alívio sintomático de dores de cabeça, sendo também útil para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores associadas a artrites e cólica menstrual.

POSOLOGIA

USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS

Ingerir 2 comprimidos de 6 em 6 horas. Não exceder o total de 8 comprimidos, em doses fracionadas, em um período de 24 horas. Duração do tratamento: depende do desaparecimento dos sintomas.

ATENÇÃO: A dose diária total recomendada de paracetamol é de 4000 mg administrados em doses fracionadas, não excedendo 1000 mg/dose em intervalos de 4 a 6 horas, em um período de 24 horas.





ADVERTÊNCIAS

A dose recomendada de paracetamol não deve ser ultrapassada. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não use com outro produto que contenha paracetamol. Este medicamento contém paracetamol. Pacientes adultos podem desenvolver insuficiência hepática aguda no caso de ingestão de mais de 4g de paracetamol em 24 horas, uso concomitante de outros medicamentos contendo paracetamol ou ingestão de 3 ou mais doses de bebida alcoólica por dia durante o tratamento. Consulte seu médico antes de usar o medicamento se você já possui problemas no fígado. Consulte seu médico antes de utilizar este medicamento se você está tomando varfarina ou outros derivados cumarínicos.

NÃO USE OUTRO PRODUTO QUE CONTENHA PARACETAMOL

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 a 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

**AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS.**

MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC nº 576/2021.

Farmacêutico Responsável: Rodrigo Rebelo Peters - CRF/SC 4116

AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Rodovia SC 390, Km 459, nº 500, Bairro Ilhota, Distrito Industrial

CEP: 88720-000, Pedras Grandes, SC

C.N.P.J.: 01.858.973/0001-29

INDÚSTRIA BRASILEIRA



PAPEL RECICLÁVEL

SIA Serviço de
Informação
Airela
0800 646 2010
www.airela.com.br

airela
PHARMACEUTICA

