



AFOLIMAX[®]

ácido fólico



FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Forma farmacêutica: solução oral - gotas

Concentração do princípio ativo: 0,2 mg/mL

Apresentações: Caixa contendo 50 e 100 frascos plásticos opacos com 30 mL cada

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Composição:

Cada mL (20 gotas) da solução oral contém:

Ácido fólico 0,2 mg

Excipientes q.s.p 1 mL

Excipientes: sucralose, metilparabeno, propilparabeno, sorbitol 70%, propilenoglicol, aroma líquido de laranja, corante de caramelo C, hidróxido de sódio, glicerol e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

INDICAÇÕES

Este medicamento é indicado para prevenção e tratamento da carência de folatos e redução da ocorrência de malformações fetais.

MODO DE USAR

USO ADULTO:

Prevenção de ocorrência de malformações fetais: Tomar 2 mL ao dia.

Prevenção de deficiência de ácido fólico: Tomar 2 mL ao dia.

Para gestantes e lactantes: tomar 4 mL ao dia.

Tratamento de deficiência de ácido fólico: Tomar até 5 mL ao dia.

USO PEDIÁTRICO:

Prevenção de deficiência de ácido fólico:

LACTENTES (0 a 11 MESES): Tomar 0,5 mL ao dia.

CRIANÇAS (1 a 10 ANOS): Tomar 1,5 mL ao dia.





CONTRAINDICAÇÕES

Este medicamento é contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade ao ácido fólico. A presença de ácido fólico nas preparações líquidas, pode aumentar a absorção do ferro alimentar, o que pode ser prejudicial aos pacientes talassêmicos que apresentam acúmulo deste elemento nos tecidos. Logo, o medicamento não deve ser administrado antes ou logo após as refeições. Doses muito altas de ácido fólico podem ocasionar convulsões em pacientes epiléticos tratados com fenitoína.

Doses de ácido fólico acima de 0,1mg/dia podem mascarar casos de anemia perniciosa, pois as características hematológicas são normalizadas, enquanto os danos neurológicos progredem.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 a 30 °C). Após aberto, válido por 6 meses.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199/2006. AFE Nº 1.04493-8

Farmacêutico Responsável: Rodrigo Rebelo Peters - CRF/SC 4116

AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Rodovia SC 390, Km 459, nº 500 Bairro Ilhota, Distrito Industrial

CEP: 88720-000, Pedras Grandes, SC

C.N.P.J.: 01.858.973/0001-29

INDÚSTRIA BRASILEIRA



PAPEL RECICLÁVEL

SIA Serviço de
Informação
Airela
0800 646 2010
www.airela.com.br

airela
PHARMACEUTICA

