



SULFERMAX[®]

sulfato ferroso



FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Forma farmacêutica: solução oral e comprimidos revestidos

Concentração do princípio ativo: solução oral 25 mg/mL de ferro elementar.

Comprimido revestido 40 mg de ferro elementar.

Apresentação hospitalar: Solução oral: Caixa contendo 100 frascos plástico com 30 mL cada.

Comprimido revestido: Display contendo 500 comprimidos revestido.

USO ORAL

SOLUÇÃO ORAL: USO ADULTO E PEDIÁTRICO COMPRIMIDOS REVESTIDO: USO ADULTO

Composição solução oral:

Cada mL (20 gotas) da solução oral contém:

Sulfato ferroso heptaidratado..... 125 mg*

Excipientes q.s.p..... 1 mL

Excipientes: ácido cítrico, metabissulfito de sódio, sorbitol 70%, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol, sacarina sódica, ciclamato de sódio, aroma de caramelo, corante caramelo e água purificada.

* Equivalente a 25 mg de ferro elementar.

Composição comprimido revestido:

Cada comprimido revestido contém:

Sulfato ferroso 124 mg*

* Equivalente a 40 mg de ferro elementar.

(Excipientes: croscarmelose sódica, celulose microcristalina, lactose, macrogol, dióxido de silício, talco, álcool polivinílico, dióxido de titânio, monocaprilocaprato de glicerila e água purificada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

INDICAÇÕES

Auxiliar nas anemias carenciais.

POSOLOGIA GOTAS

USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Cada 1 mL (20 gotas).

Uso adulto.

Maiores de 12 anos e adultos: ingerir 4mL (80 gotas) uma vez por dia.





Uso pediátrico.

Crianças de 6 meses até 18 meses: ingerir 1mL (20 gotas) uma vez por semana.

Crianças de 18 meses a 6 anos: ingerir 1mL (20 gotas) uma vez por dia.

Crianças de 6 a 12 anos: ingerir 2mL (40 gotas) uma vez por dia.

POSOLOGIA COMPRIMIDOS

USO ORAL. USO ADULTO

Uso adulto.

Ingerir 1 comprimido ao dia por via oral e em jejum.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Pacientes portadores de doenças hepáticas, úlcera péptica, gástrica ou duodenal, alcoolismo, insuficiência renal, indivíduos com hipersensibilidade. Administração de ferro por períodos maiores que 6 meses deve ser evitada. A administração de ferro não deve ser utilizada para o tratamento de anemia hemolítica em pacientes recebendo transfusão sanguínea e em uso de ferro por via parenteral.

REAÇÕES ADVERSAS

Constipação, diarreia, fezes escuras, náuseas, dor abdominal, vômito, azia, sangramento nas fezes, escurecimento dos dentes, irritação na garganta, urina escura, hemossiderose (acúmulo de ferro nos tecidos).

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30 °C). Proteger da luz e umidade.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTINDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVE SER CONSULTADO.

MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC nº 576/2021.

Farmacêutico Responsável: Rodrigo Rebelo Peters – CRF/SC 4116

AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Rodovia SC 390, km 459, nº 500 – Bairro: Ilhota/Distrito Industrial
Pedras Grandes/Santa Catarina – CEP 88720-000

CNPJ: 01.858.973/0001-29

INDÚSTRIA BRASILEIRA



PAPEL RECICLÁVEL

SIA Serviço de
Informação
Airela
0800 646 2010
www.airela.com.br

airela
PHARMACEUTICA

